

BCGワクチン接種を受ける前の注意点

BCG接種までの注意事項

- 現在治療中または経過観察中の病気のある人
 - ・ 事前にBCG接種をうけてよいかを主治医に確認しておいてください。
- 皮膚疾患がありステロイド剤軟膏使用中である人
 - ・ BCG接種予定部位肩から肘にかけてが、ジュクジュクしていたり炎症があれば接種ができない場合がありますので、主治医へ相談してください。
 - ・ ステロイド軟膏(保湿剤と混合されているものを含む)を塗布している場合、接種予定部位(両肩から肘にかけて)は**前日の朝よりステロイド軟膏塗布は中止**してください。
※接種予定部位以外の軟膏使用は可能です。
- 生ワクチン接種予定のある人
 - ・ BCGワクチンは生ワクチンです。
任意で生ワクチンの接種(MR・水痘・おたふく)を受けられた又は受ける予定のある場合は、接種日より27日間の接種間隔をあける必要があるため、当院小児科へご相談ください。
- 結核患者との接触がある人
 - ・ 事前にお住まいの区の保健福祉センターへご相談ください。
※主治医の接種許可がある場合でも、接種の可否については当日の医師の判断となります。

来院当日の注意事項

- **接種前後30分の授乳は控えてください。**(吐乳防止や副反応鑑別のため)
- 接種部位を清潔に保つため、保護者が**長髪の場合は結んで**おいてください。
- 接種部位を確保するため、上半身脱がさせていただきます。**着脱しやすい衣服**で来院してください。
- 接種来院時に**母子手帳・予防接種手帳**をお忘れの場合は接種できません。
お忘れのないよう準備をお願いいたします。